

Warnhinweis: Korrekturen

Aktuell vom 26.06.2024

KINDERSICHER
T.O. ZUCK

Durch Änderungen und Anpassungen haben wir den Infoflip auf die aktuell 17. Auflage 6/2021 aktualisiert. Leider haben sich bis zur 12. Auflage auch die folgenden Fehler eingeschlichen, die in den meisten Exemplaren schon korrigiert wurden.

Seit der 12. Auflage wurden die Angaben immer wieder aktualisiert und angepasst jedoch ohne nachfolgend aufgeführte Druck- und Setzfehler, die zu relevanten Irritationen und Dosisabweichungen führen könnten.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, kontrollieren Ihren Infoflip und verbessern die aufgeführten Aktualisierungen, z.B. mit einem wasserfesten, desinfektionsmittelbeständigem Folienstift.

Falls Sie nicht an Ihrem Infoflip herumbasteln wollen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir senden Ihnen gern eine aktuelle Auflage zum Selbstkostenpreis zu: info@kindersicher.me

12. sowie alle vorangegangenen Auflagen

- Die Farbskala der Lund & Browder-Tafel ist nicht maßstäblich: hier gilt das angegebene Alter

10. Auflage

- Grau, Rosa, Rot: Larynx tuben können für Kinder < 10 Kg nicht mehr uneingeschränkt empfohlen werden
- Die Dosierung für **Ketanest S i.m./i.n.** ist mit 2 mg/kg für Verbrennungspatienten und Polytraumatisierte sehr hoch angegeben. Bei isolierten Verletzungen beginnen sie daher i.m./i.n. besser mit **0,5 mg/kg**. Zur Analgesie mit **Ketanest S i.v.** sollten Sie mit **0,25 mg/kg** beginnen und nach Wirkung titrieren

4. Auflage

- Gelb, Kasten Notfall/ Rea, Spalte Flumazenil (Anexate): Korrekte Dosis = **1,3 ml** statt 3,3 ml

3. Auflage

- Weiss bis Grün Kasten Narkose/ Krampf, Spalte Diazepam Rectiole = Diazepam **10** statt 5 Rectiole
- Gelb, Kasten Notfall/ Rea, Spalte Naloxon: Korrekte Dosis = **3,2 ml** statt 1,3 ml

2. Auflage (ergänzend zu den oben angeführten Korrekturen)

- Grau 5 Kg Kasten Narkose/ Krampf, Spalte Sufentanil: Konzentration = **0,5 ug** anstatt 1 ug/ml
- Rosa, Kasten Notfall/ Reanimation: Adenosin Rosa: 0,65 mg = **0,22 ml** anstatt 0,65 ml.
- Gelb, Kasten Analgesie, Spalte Morphin. Die korrekte Dosis sind 1.3 mg = **1,3 ml** statt 0,65 ml

1. Auflage (ergänzend zu den oben angeführten Korrekturen)

- Unter Perfusoren/ Disoprivan (Propofol) 1% lautet die korrekte Einheit 5-10 **mg/kg/h** in allen Farbbereichen!
- Grün, Orange, Spalte Ketanest S 25 mg/ml i.m./i.n.: Konzentration 25 mg/ml pur („+ 4 ml NaCl“ streichen!)
- Rosa, Perfusoren/ Remifentanil (Ultiva) ist die korrekte Konzentration: 5 mg/50 ml NaCl = **100 µg/ml**

Wir bedauern, dass es trotz größter Sorgfalt zu diesen Fehlern gekommen ist und entschuldigen uns bei allen KINDERSICHER-Anwendern. Wenn Sie die genannten Korrekturen durchgeführt haben, ist Ihr Infoflip wieder aktuell und...Kindersicher!

